

Vad är SRS Bedömningsstöd?

Förkortningen SRS står för *Stöd för Rätt Sjukskrivning*, och är ett datadrivet och kunskapsbaserat bedömningsstöd inom sjukskrivningsområdet för primärvården.

Bedömningsstödet kan hjälpa dig som läkare att tidigt identifiera individer med ökad risk för lång sjukskrivning och även ge dig förslag på åtgärder för att öka individens möjlighet till återgång i arbetslivet.

Läs mer på rattsjukskrivning.se

Där finner du bland mer information om råd och åtgärder, en förklaring till riskberäkningen, ytterligare statistik och information till pilotdeltagare. Under fliken support finns kontaktuppgifter för frågor och felanmälan.

SRS Bedömningsstöd i Rehabstöd

Ny sjukskrivning - identifiera riskpatienter

Steg 1. Klicka på "Pågående sjukfall"

Genom att klicka på länken "Visa pågående sjukfall" får du fram en lista över de sjukfall som finns på din enhet just nu.

Steg 2. Se kolumnen "Risk"


Det är här SRS bedömningsstöd blir tydligt i Rehabstöd.

I de fall läkaren har valt att göra en riskberäkning vid intygsskapandet i Webcert, kan du se resultatet här.

Riskberäkningen visas i Rehabstöd som tre prickar. Dessa prickar visar hur hög risken är för att patientens sjukskrivning blir längre än 90 dagar.

- En gul prick betyder att patienten har *måttlig risk* för lång sjukskrivning
- Två orangea prickar betyder att patienten har *hög risk* lång sjukskrivning
- Tre röda prickar betyder att patienten har *mycket hög risk* för lång sjukskrivning

Om ingen riskberäkning gjorts, men diagnosen finns i bedömningsstödet visas detta som ett streck i riskkolumnen.




The screenshot shows the 'Rehabstöd' interface. At the top, there's a navigation bar with the user's name 'Annika Johansson - Läkare' and the unit 'Alfa-enheten'. Below that, a section titled 'Mina pågående sjukfall på Alfa-enheten' contains several filter options like 'Välj diagnos', 'Välj kompetensregisterstatus', and 'Fristattör'. The main part of the screenshot is a table with columns for patient ID, name, gender, diagnosis, start date, end date, length, and risk level. The risk level is indicated by a number of colored dots (yellow, orange, red) or a dash. For example, patient 1 has a risk level of 5 (5 red dots), patient 2 has 4 (4 orange dots), patient 3 has 1 (1 yellow dot), patient 4 has 1 (1 dash), patient 5 has 1 (1 dash), and patient 6 has 1 (1 dash).

Du kan välja att sortera listan av sjukskrivna patienter utifrån deras risknivå för att snabbt få en överblick över vilka patienter som är viktiga att ha lite extra koll på, och säkerställa att rätt åtgärder sätts in i rätt tid och genomförs.


Steg 3. Klicka på en patient och på "Visa intyg"

När du klickar på en patient med riskberäkning i listan visas sjukfallet med de intyg som ingår. Klicka på "Visa intyg" på det intyg där riskberäkningen är gjord så öppnas en kopia på sjukintyget.


Uppe till höger finns en flik där det står Risk och Råd. Under denna flik hittar du SRS bedömningsstöd.



Överst ser du råd till dig som rehabkoordinator. Dom syftar till att påminna dig om viktiga faktorer för just dig att tänka på.



Du ser den aktuella risken i stapeldiagrammet. Du kan ställa muspekaren på stapeln för att få mer information om bland annat datumet risken beräknades och läkarens bedömning.



I det fall läkaren inte har valt att göra en riskberäkning vid intygsskrivandet, visas endast den genomsnittliga risken.



Längre ner kan du se vilka råd och åtgärder som bedömningsstödet rekommenderar för den aktuella diagnosen.

Förlängning av sjukskrivning

Riskberäkning


I SRS finns möjlighet för läkaren att göra riskberäkning även vid förlängning. Det kan vara aktuellt om ingen riskberäkning gjorts vid första sjukskrivningstillfället.

Det kan också vara så att en patient kan ha flera riskberäkningar gjorda. Det kan då handla om att diagnosen ändrats under pågående sjukskrivning eller att något i patientens situation förändrats som gjort att läkaren gjort en ny riskberäkning.

Under pågående sjukfall visas alltid den *senast* beräknade risken i riskkolumnen.

Om du går in på ett sjukfall där flera riskberäkningar är gjorda, klickar du "Visa intyg" på den senaste beräknade risken för att se aktuell information och anledningen till att en ny riskberäkning gjorts.

Risken gäller F438 Andra specificerade reaktioner på svår stress



Nya råd vid förlängning

Här får läkaren också ta del av nya råd som är viktiga att tänka på vid en förlängning av sjukskrivning.

Tänk på att vid förlängning


- Följa upp och utvärdera pågående åtgärder. [visa mer](#) ▾
- Alltid överväga om deltidssjukskrivning är ett alternativ till heltidssjukskrivning [visa mer](#) ▾
- Tidigt kontakta arbetsgivaren om du tror att anpassningar kan bidra till att patienten trots sina besvär kan arbeta [visa mer](#) ▾
- Om möjligt planera successiv nedtrappning i ett och samma läkarintyg [visa mer](#) ▾

[Se fler](#) ▾

Om patientens diagnos byts

Om läkaren byter diagnos vid förlängning och har gjort en ny riskberäkning så kommer den tidigare riskberäkningen inte att vara tillgänglig eftersom den gällde för en annan diagnos. Råd, åtgärdsrekommendationer och statistik som visas är för den nya diagnosen.

Risken gäller F320 Lindrig depressiv episod



Förlängning efter 60 dagar

Om sjukskrivningen är längre än 60 dagar går det inte att göra någon riskberäkning. Det beror på att de prediktiva modellerna tagits fram för att så tidigt som möjligt identifiera risk för sjukskrivning längre än 90 dagar och inte är optimerade för att göra korrekta beräkningar när patienten varit sjukskriven 60 dagar eller längre. Om det har gjorts en tidigare riskberäkning visas denna.

Risken gäller F43 Anpassningsstörningar och reaktion på svår stress

